



पछाडिको भाग र थुन वरिपरि गिर्खा देखिएको

## फार्मको सुरक्षा कसरी गर्ने ?

- खोप लगाएर- प्रभावकारी खोप लगाएको तीन हप्ता भित्रमा रोग विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुन्छ।
  - संक्रमित हुनु अघि नै गाईभैंसीलाई खोप लगाउनु पर्छ।
  - खोपले कहिलेकाहीँ केही गाईभैंसीमा निम्न अनुसारका प्रतिक्रियाहरू देखाउन सक्छ:
    - खोप लगाएको ठाउँमा हलुका सुत्रिन्छ, जुन १-२ हप्ता भित्रमा आफै हराएर जान्छ।
    - छोटो समयको लागि ज्वरो आउनुका साथै केही दिन दूध उत्पादन घट्न सक्दछ।
    - शरीर वा थुनमा साना गिर्खाहरू देखिन सक्छ जुन छिट्टै हराउँदछन्।
- विश्वसनीय स्रोतहरूबाट गाईभैंसी खरिद गर्नुपर्दछ। गाईभैंसी खरिद गरी ल्याएमा २८ दिनसम्म बथानबाट अलग्गै राख्नुपर्दछ। रोगको प्रकोपको समय रोग लागेको ठाउँबाट गाईभैंसी ल्याउनु हुँदैन।

- गोठलाई झिंगा, लामखुट्टे तथा अन्य किराहरूबाट मुक्त राख्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्दछ र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कीट विकर्षकको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
- गोठ वरिपरि पानी जम्न दिनु हुँदैन।
- फार्ममा जैविक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ।


## थप जानकारीका लागि

नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय  
पशु सेवा विभाग  
सार्क-आर.एस.यु.  
SAARC - R.S.U. (Regional Support Unit)  
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, फोन/फ्याक्स: ०१ ४२६४६२२  
ईमेल: saarcrsu@gmail.com, वेबसाइट: www.saarcrsu.gov.np



नेपाल सरकार  
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय  
पशु सेवा विभाग  
सार्क-आर.एस.यु.  
SAARC - R.S.U. (Regional Support Unit)

# लम्पी स्किन रोगबारे जानकारी



किसानको लागि